






Späte Eröffnungsphase






Austreibungsphase




Geburtsablauf



1. Vor der Geburt

MM geschlossen
Portio erhalten, mediosacral
VT Kopf über BE
1. HHL



2. Frühe Eröffnungsphase

MM 1 cm
Portio 0,5 cm
VT Kopf über BE
2. HHL
PN quer
Abgang des Schleimpfropfes




3. Frühe Eröffnungsphase

MM 3 – 4 cm
Portio dünnsäumig
VT in BE -4
Fruchtblase tastbar
PN quer




4. Späte Eröffnungsphase

MM 6 cm
Portio dünnsäumig
VT -3
Fruchtblase prall
PN quer
Beugung des Köpfchens



5. Späte Eröffnungsphase

MM 8 cm
VT -2
Portio verstrichen
Fruchtblase gesprungen




6. Übergangsphase

MM vollständig
Kopf in BM
PN dreht in Richtung des 2. schrägen Durchmessers



7. Austreibungsphase: Tiefertreten des Kindes

Kopf auf +2
PN im 2. schrägen Durchmesser
Druck auf Darm löst Presswehen aus




8. Austreibungsphase: Tiefertreten des Kindes

Kopf auf BB
PN gerade
Anus klafft




9. Austreibungsphase: Kopf dehnt den Damm

Kopf auf BB, schiebt sich um die Symphyse




10. Austreibungsphase: Köpfchen geboren

Schultern treten quer in den BE ein




11. Austreibungsphase: Drehung der Schultern

äußere Rotation des Kopfes, innere Rotation der Schultern



12. Austreibungsphase: Geburt

Entwicklung des Kindes aus 2. HHL



13. Postpartum

Retroplazentäres Hämatom
Lösung der Plazenta



14. Postpartum

Fundus 2 – 3 QF unter dem Nabel
Uterus stark kontrahiert zur Blutstillung



15. Puerperium

8. Tag p. p.
Fundus etwa 3 QF über der Symphyse